

FATTY ACIDS PROFILE OF LOCAL MALE LAMB REARED IN THE VILLAGE ON DIFFERENT SLAUGHTER WEIGHT AND MUSCLE

ABSTRACT

Meat from lamb contained more saturated fatty acids than poultry. Consumption meat with high saturated fatty acids should be controlled due to atherosclerosis risk which lead to coronary heart attack. The objective of the research was to study fatty acids profile of local male lamb on different slaughter weight (SW) and muscle. Local lambs derived from Temanggung, aged 1.5-12 months were slaughtered at 6 categories SW with range 5-30 kg. The lamb was slaughtered and sampled for fatty acids determination especially on loin, leg, and shoulder muscles. The nested ANOVA was used to analyze data and any differences among the groups were further tested using Duncan Multiple Range Tests (DMRT). The results showed that different SW produced different lauric, myristic, palmitic, and palmitoleic acids ($P<0.05$), but myristoleic, heptadecanoic, stearic, oleic, linoleic, and linolenic acids were not significant ($P>0.05$). Low lauric acids content can be found from 25, 20, 30, 10, 15 and 7 kg SW e.g. 3.86, 11.41, 12.29, 21.86, 27.03 and 40.15 mg/100 g meat, respectively. Low myristoleic acids content were found from 25, 20, 30, 10, 7 and 15 kg SW e.g. 34.57, 47.50, 58.34, 82.42, 111.17 and 132.48 mg/100 g meat, respectively. Low palmitic acids content were found from 25, 20, 7, 30, 10 and 15 kg SW e.g. 367.10, 442.86, 497.78, 619.55, 638.44 and 851.94 mg/100 g meat, respectively. Low palmitoleic acids content were from 10, 7, 30, 25, 20 and 15 kg SW e.g. 45.59, 52.09, 137.09, 220.95, 249.63, 255.38 mg/100 g meat, respectively. Average content of myristic, heptadecanoic, stearic, oleic, linoleic, and linolenic acids were 77.75, 53.75, 342.81, 693.23, 1448.42 and 199.42 mg/100 g meat, respectively. Fatty acids of lamb meat from loin, leg and shoulder were not significantly different ($P>0.05$), but from quantitative value of fatty acids from loin were lower. The lamb meat with the lowest lauric, myristic and palmitic acids were produced from 25 kg SW (aged 9 months), but lamb meat with the highest palmitoleic acids from 15 kg SW (aged 5 months). The quantitative value showed that fatty acids of lamb meat from loin were lower than lamb meat from leg and shoulder.

(Key words : Lamb, Slaughter weight, Muscle kinds, Fatty acids).

Pendahuluan

Dewasa ini, terutama di negara-negara maju dan masyarakat menengah ke atas, pangan yang dikonsumsi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan zat-zat gizi bagi tubuh, namun telah memperhitungkan juga efeknya terhadap kesehatan. Salah satu efek yang diperhitungkan adalah risiko terjadinya atherosclerosis akibat sering mengkonsumsi pangan yang kadar lemaknya tinggi. Diketahui bahwa atherosclerosis adalah penyebab penyakit jantung koroner yang merupakan penyebab kematian manusia Indonesia di urutan pertama untuk usia di atas 40 tahun (Survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional tahun 1992 dalam Lestariana, 2003).

Kadar lemak daging bervariasi, tergantung dari jumlah lemak eksternal dan lemak intramuskular. Ditinjau dari segi nutrisi, komponen lemak yang penting adalah trigliserida, fosfolipida kolesterol, dan vitamin yang terlarut dalam lemak. Trigliserida mengandung asam-asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Asam lemak jenuh pada daging meliputi stearat dan palmitat, sedangkan asam-asam lemak tidak jenuh pada daging antara oleat, linoleat, dan linolenat (Soeparno, 1989).

Daging dari ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba mengandung asam lemak jenuh yang lebih tinggi dibandingkan non ruminansia (Soeparno, 1995). Kandungan asam lemak jenuh daging domba lebih tinggi daripada daging sapi (Bahar, 2003).

Komposisi asam lemak domba terdiri dari miristat, palmitat, palmitoleat, stearat, oleat, linoleat, dan lain-lain, masing-masing sebanyak 3, 21, 4, 20, 41, 5, dan 6 g/100 g asam lemak total (Almatsier, 2001).

Konsumsi lemak, terutama asam lemak jenuh (*saturated fatty acids*), asam lemak tidak jenuh trans (*trans unsaturated fatty acids*), dan kolesterol merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan *low density lipoprotein* (LDL) dalam darah dan mempertinggi risiko terjadinya penyempitan pembuluh darah koroner yang mengakibatkan manusia menderita penyakit jantung koroner (Supari, 2002). Hal ini disebabkan karena hampir seluruh trigliserida (90%) terutama yang bersifat jenuh bisa diserap tubuh dengan mudah, sementara kolesterol makanan yang dapat diserap tubuh hanya 20-50% (Apriadiji, 2003). Di dalam tubuh, asupan lemak makanan dibawa ke hati untuk diubah menjadi kolesterol. Agar mudah didistribusikan ke seluruh tubuh, kolesterol berikatan dengan protein membentuk lipoprotein. Jika masih banyak mengandung kolesterol, maka ikatan lipoproteinnya sedikit mengandung protein sehingga berat jenisnya rendah (LDL). Dalam perjalanan LDL meninggalkan hati menuju ke seluruh jaringan tubuh, muatan kolesterol yang berlebihan akan mudah tercecer di sepanjang pembuluh darah. Akibatnya, dapat terjadi penyempitan arteri (aterosklerosis), yang bisa mengakibatkan *stroke* dan serangan jantung. Pola asupan lemak ideal adalah kurang 30% dari seluruh kalori yang terdiri dari 60% *monounsaturated fatty acids*, 10% *saturated fatty acids*, dan sisanya *polyunsaturated fatty acids* denganimbangan lemak omega 6 dan omega 3 adalah 4 dibanding 1.

Sebagai insan peternakan, hal-hal seperti tersebut di atas harus diperhatikan dalam usaha produksi daging ternak. Sifat kimia daging (termasuk komposisi asam lemak) bervariasi tergantung spesies hewan, umur, jenis kelamin, pakan, serta lokasi anatomic dan fungsi bagian-bagian otot dalam tubuh (Romans *et al.*, 1994; Rusman *et al.*, 2000). Selain itu, bobot tubuh ternak ruminansia juga mempunyai hubungan yang erat dengan bobot komponen-komponen kimianya (Soeparno, 1994). Penelitian ini dar

bertujuan untuk mengetahui profil asam lemak daging domba pada bobot potong dan lokasi otot yang berbeda. Lokasi otot yang diamati kadar asam lemak dagingnya adalah pada bagian *loin* (punggung), paha, dan pundak.

Materi dan Metode

Pemotongan ternak dan pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Ternak Potong dan Kerja, Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang selama 6 minggu. Analisis komposisi asam lemak daging dilakukan di Laboratorium Biokimia Pusat Antar Universitas, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Domba lokal jantan sehat sebanyak 18 ekor dengan umur 1,5-12 bulan yang digunakan sebagai subyek penelitian diperoleh dari Kelompok Tani Ternak "Ngudi Raharjo" di desa Pagergunung, kecamatan Pringsurat, kabupaten Temanggung, untuk mendapatkan bangsa ternak dan latar belakang nutrisi yang sama. Domba tersebut dipotong dengan teknik pemotongan beruntun (Butterfield, 1988) pada 6 kategori bobot potong (BP) dengan kisaran 5-30 kg, yakni 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 kg sehingga ada 3 ekor domba sebagai ulangan pada setiap bobot potong.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat untuk memotong ternak serta timbangan untuk menimbang ternak dan sampel daging. Timbangan untuk menimbang ternak adalah timbangan gantung (*hanging scales*) merk *five goats* buatan China dengan kapasitas 50 kg dan ketelitian 200 g, sedangkan timbangan untuk menimbang sampel adalah timbangan elektronik merk *adventurer OHAUS* tipe AR1530 dengan kapasitas 150 g dan ketelitian 0,001 g. Alat untuk menganalisis kadar asam lemak daging adalah gas chromatography.

Pemotongan domba sesuai dengan bobot potong yang telah ditentukan dilakukan secara halal setelah dipuaskan terhadap pakan selama 22 jam. Tujuan pemuasaan domba sebelum pemotongan adalah untuk memperkecil variasi bobot potong akibat isi saluran pencernaan dan untuk mempermudah pelaksanaan pemotongan.

Air minum diberikan. Pemotongan memotong leher (*oesophagus*, dan *trachea* rahang bawah) agar yang sempurna. Kaki diikat agar cairan ternak tersebut tidak dari tubuh pada bagian depan dan kaki belakang (*carpo-metacarpal*). Ternak tersebut duduk pada kedua kaki lalu dilepas.

Karkas segar organ tubuh bagian reproduksi, hati, trachea, alat pencernaan kecuali ginjal. Kaki ekornya, kemudian sepanjang tulang *vertebrae cervicales* dan *vertebrae sacralis* segar kiri dan kanan.

Sampel daging diambil dari karkas domba pada bagian *loin*, paha, dan pundak.

Analisis variansi pada 1980). Untuk mengetahui ketidakteraturan data ditransformasi. Transformasi ini mencakup wiper dan Gomez, 1995. Dari uji yang dilakukan dengan uji wilayah Torrie, 1991).

Hasil dan Pembahasan

Asam lemak daging domba diidentifikasi pada bagian *loin*, *paha*, dan *shoulder* yang terdiri dari asam miristat, palmitat, dan sebagainya.

profil asam lemak
ong dan lokasi otot
ang diamati kadar
n pada bagian *loin*
tode

dan pengambilan
ni dilakukan di
Potong dan Kerja,
rsitas Diponegoro
Analisis komposisi
n di Laboratorium
rsitas, Universitas

hat sebanyak 18
an yang digunakan
diperoleh dari
di Raharjo" di desa
ngsurat, kabupaten
tkan bangsa ternak
ang sama. Domba
eknik pemotongan
 pada 6 kategori
aran 5-30 kg, yakni
ehingga ada 3 ekor
ada setiap bobot

gunakan dalam
angkat alat untuk
imbangan untuk
sampel daging.
ng ternak adalah
(*scale*) merk *five*
apasitas 50 kg dan
timbangan untuk
imbangan elektronik
pe AR1530 dengan
0,001 g. Alat untuk
nak daging adalah

esuai dengan bobot
n dilakukan secara
adap pakan selama
n domba sebelum
emperkecil variasi
an pencernaan dan
naan pemotongan.

Air minum diberikan secara *ad libitum*.

Pemotongan ternak dimulai dengan memotong leher hingga *vena jugularis*, *oesophagus*, dan *trachea* terputus (dekat tulang rahang bawah) agar terjadi pengeluaran darah yang sempurna. Kemudian ujung *oesophagus* diikat agar cairan rumen tidak keluar apabila ternak tersebut digantung. Kepala dilepaskan dari tubuh pada sendi *occipito-atlantis*. Kaki depan dan kaki belakang dilepaskan pada sendi *carpo-metacarpal* dan sendi *tarso-metatarsal*. Ternak tersebut digantung pada *tendo-achiles* pada kedua kaki belakang, kemudian kulitnya dilepas.

Karkas segar diperoleh setelah semua organ tubuh bagian dalam dikeluarkan, yaitu alat reproduksi, hati, limpa, jantung, paru-paru, trachea, alat pencernaan, empedu, dan pancreas, kecuali ginjal. Karkas segar ini dipotong ekornya, kemudian dibelah secara simetris sepanjang tulang belakangnya dari leher (*Ossa vertebrae cervicalis*) sampai sakral (*Ossa vertebrae sacralis*) sehingga diperoleh karkas segar kiri dan kanan.

Sampel daging untuk analisis asam lemak diambil dari karkas sebelah kanan pada bagian *loin*, paha, dan pundak. Preparasi metilasi asam lemak daging dilakukan dengan metode transesterifikasi *in situ* (Park dan Goins, 1994) dan pembacaan kadar asam lemak daging dengan alat gas chromatography.

Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis variansi pola tersarang/*hierarchi* (Astuti, 1980). Untuk mengatasi keheterogenan ragam dan ketidaknormalan data, sebelum dianalisis data ditransformasi ke logaritma karena transformasi ini cocok untuk data bilangan bulat yang mencakup wilayah nilai yang lebar (Gomez dan Gomez, 1995). Apabila terjadi perbedaan dari uji yang dilakukan, maka dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan (Stell dan Torrie, 1991).

Hasil dan Pembahasan


Asam lemak daging domba yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini ada 10 macam yang terdiri dari asam-asam lemak jenuh (laurat, miristat, palmitat, heptadekanoat, dan stearat)

dan asam-asam lemak tidak jenuh (miristolat, palmitoleat, oleat, linoleat dan linolenat). Urutan kadar asam lemak daging domba tersebut (per 100 g daging) dari yang terbanyak adalah linoleat (C18:2) = 1448,42 mg (40,33%), oleat (C18:1) = 693,23 mg (19,30%), palmitat (C16:0) = 569,61 mg (15,86%), stearat (C18:0) = 342,81 mg (9,54%), linolenat (C18:3) = 199,42 mg (5,55%), palmitoleat (C16:1) = 160,12 mg (4,46%), miristat (C14:0) = 77,75 mg (2,16%), heptadekanoat (C17:0) = 53,75 mg (1,50%), miristolat (C14:1) = 27,07 mg (0,75%), dan laurat (C12:0) = 19,44 mg (0,54%). Untuk lebih jelasnya, profil asam lemak daging domba hasil penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa asam lemak daging domba yang digunakan sebagai subyek penelitian sebagian besar (85,03%) terdiri dari linoleat, oleat, palmitat, dan stearat. Pada sapi Angus, Hereford, Fries Holand dan Murray Grey, asam lemak daging yang utama adalah oleat, palmitat, linoleat, dan stearat (Rusman *et al.*, 2000).

Asam lemak linoleat adalah asam lemak tidak jenuh berikatan rangkap dua yang disebut *Poly Unsaturated Fatty Acid* (PUFA). Berdasarkan letak atau posisi ikatan rangkap terhitung dari gugus metil pada rantai karbon molekul asam lemak, linoleat dikenal sebagai asam lemak omega-6. Asam lemak linoleat merupakan salah satu asam lemak esensial bagi tubuh manusia, artinya harus tersedia dalam makanan sehari-hari karena tidak dapat disintesis di dalam tubuh. Asam-asam lemak esensial sangat baik bagi perkembangan otak, susunan syaraf pusat maupun syaraf tulang punggung. Kekurangan asam lemak esensial dapat menghambat pertumbuhan bayi dan anak-anak, kegagalan reproduksi, gangguan pada kulit, ginjal dan hati serta mengakibatkan degenerasi (kerusakan) bagian-bagian susunan syaraf yang diperkirakan dapat menyebabkan kehilangan daya ingat pada usia menengah dan menurunnya fungsi otak secara drastis (Almatsier, 2001; Khomsan, 2004).

Khasiat asam linoleat baik bagi kesehatan tubuh karena asam lemak ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan, gangguan fertilitas, kerapuhan sel darah merah,

Gambar 1. Profil asam lemak domba lokal (*Fatty acids profile of local lamb*).

dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh (Khomsan, 2004). Dewasa ini banyak ahli nutrisi tertarik dengan khasiat asam lemak linoleat dalam bentuk terkonjugasi yang disebut CLA (*conjugated linoleic acid*) karena terbukti penting bagi kesehatan, yakni dapat menghambat pertumbuhan kanker, mengurangi risiko penyakit jantung dan diabetes, menstimulasi fungsi kekebalan, serta merupakan faktor pertumbuhan. Secara alami, CLA banyak terdapat di dalam susu, daging, dan produk-produk olahannya. Laporan Yulianto yang disitasi oleh Legowo (2004) menunjukkan bahwa kadar CLA yang tinggi terdapat pada daging domba (1,20%), daging sapi (0,60%), susu (0,98%), dan mentega (0,97%), dengan persentase berdasarkan kadar total lemaknya.

Asam lemak oleat juga merupakan asam lemak tidak jenuh tetapi berikatan rangkap tunggal yang disebut MUFA (*mono unsaturated fatty acid*). Asam lemak oleat dikenal juga sebagai asam lemak omega-9. Asam lemak ini memiliki daya perlindungan tubuh yang mampu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kadar kolesterol *High Density Lipoprotein* (HDL) (Apriadi, 2003; Khomsan, 2004). Kolesterol HDL sering disebut sebagai kolesterol baik karena mengandung protein dalam jumlah besar dan kolesterol dalam jumlah kecil, sehingga mampu mengambil sisa-sisa

kolesterol di dalam pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk dikeluarkan dari tubuh (Legowo, 1996).

Asam lemak palmitat dan stearat adalah asam lemak jenuh (*saturated fatty acid*). Palmitat merupakan bahan dasar untuk pembentukan asam lemak lainnya, karena merupakan asam lemak terpanjang atom C-nya yang dianalisis secara *denovo* (Lehninger, 1990; Meyes, 1999). Asam lemak palmitat selanjutnya dapat mengalami perpanjangan rantai dalam retikulum endoplasmik menjadi asam lemak rantai panjang lainnya. Kadar asam palmitat yang tinggi di dalam daging tidak diinginkan konsumen karena bersifat hiperlipidemik dan dapat meningkatkan kolesterol darah, sedangkan peningkatan proporsi asam stearat dalam daging menguntungkan karena asam lemak ini bersifat hipokolesterolik pada manusia (Mandell *et al.*, 1997). Kolesterol darah orang dewasa yang aman (normal) adalah kurang dari 200 mg/dl (Hui dalam Legowo, 1999).

Profil asam lemak daging domba lokal pada BP yang berbeda

Domba dengan kategori BP 5 kg sulit diperoleh di lokasi penelitian, sehingga BP paling kecil 6,80 kg. Umur domba pada setiap kategori BP adalah sekitar 1,5 ; 3; 5; 7; 9; dan 12 bulan masing-masing untuk rerata BP 7,07;

10,13; 15,13; 20,2 asam lemak da bobotpotong yang Tabel 1 dapat dilil yang berbeda m kadar asam lemak palmitoleat yang sedangkan perbeda untuk miristolat, 1 linoleat, dan linoleat


Kadar asam dari yang paling re 20, 30, 10, 15, d miristat daging do dihasilkan pada BP Kadjar asam lemak yang paling rendah 30, 10, dan 15 kg. I daging domba, dihasilkan pada BP Kadjar asam lemak (asam-asam lemak paling rendah ada bulan) kemudian d bulan), sedangkan palmitoleat (asam domba yang paling

Tabel 1. H

Asam lemak (<i>Fatty acid</i>) (mg/100g)
Lauric acid (C12:0)
Myristic acid (C14:0)
Myristolic acid (C14:1)
Palmitic acid (C16:0)
Palmitoleic acid (C16:1)
Heptadecanoic acid (C17:0)
Stearic acid (C18:0)
Oleic acid (C18:1)
Linoleic acid (C18:2)
Linolenic acid (C18:3)

^{a, b, c, d, e, f} Huruf yang
(*Different superscripts*)

1448.42



local lamb).

buluh darah dan i untuk dikeluarkan dan stearat adalah *saturated fatty acid*. Man dasar untuk k lainnya, karena anjang atom C-nya (Lehninger, 1990; palmitat selanjutnya dengan rantai dalam jadi asam lemak dar asam palmitat yang tidak diinginkan hiperlipidemik dan ol darah, sedangkan am stearat dalam na asam lemak ini k pada manusia esterol darah orang adalah kurang dari o, 1999).

domba lokal pada gori BP 5 kg sulit tian, sehingga BP domba pada setiap 5 ; 3; 5; 7; 9; dan 12 k rerata BP 7,07;

10,13; 15,13; 20,27; 25,20; dan 30,13 kg. Profil asam lemak daging domba lokal pada bobotpotong yang berbeda pada Tabel 1. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada bobot potong yang berbeda menghasilkan daging dengan kadar asam lemak laurat, miristat, palmitat, dan palmitoleat yang berbeda nyata ($P<0,05$), sedangkan perbedaan kadar asam lemak daging untuk miristolat, heptadekanoat, stearat, oleat, linoleat, dan linolenat tidak nyata ($P>0,05$).

Kadar asam lemak laurat daging domba dari yang paling rendah, dihasilkan pada BP 25, 20, 30, 10, 15, dan 7 kg. Kadar asam lemak miristat daging domba, dari yang paling rendah, dihasilkan pada BP 25, 20, 30, 10, 7, dan 15 kg. Kadar asam lemak palmitat daging domba dari yang paling rendah dihasilkan pada BP 25, 20, 7, 30, 10, dan 15 kg. Kadar asam lemak palmitoleat daging domba, dari yang paling rendah, dihasilkan pada BP 10, 7, 30, 25, 20, dan 15 kg. Kadar asam lemak laurat, miristat, dan palmitat (asam-asam lemak jenuh) daging domba yang paling rendah adalah dari BP 25 kg (umur 9 bulan) kemudian diikuti oleh BP 20 kg (umur 7 bulan), sedangkan untuk kadar asam lemak palmitoleat (asam lemak tidak jenuh) daging domba yang paling rendah dari BP 10 kg (umur 3

bulan) dan yang tertinggi dari BP 15 kg (umur 5 bulan).

Perbedaan yang nyata dari kadar asam-asam lemak di atas tidak menunjukkan pola yang pasti. Laporan Armin yang disitusi Soebagyo *et al.* (2000) menyatakan bahwa ternak ruminansia yang mengkonsumsi pakan yang mengandung asam lemak tidak jenuh mempunyai pengaruh yang kecil terhadap penyimpanan asam lemak tidak jenuh di dalam tubuh ternak tersebut karena adanya mikroflora rumen yang dapat menghidrolisis dan menghidrogenasi asam-asam lemak tidak jenuh. Waktu penggemukan yang cukup lama dapat memberikan kesempatan kepada mikroflora rumen untuk menghidrolisis asam lemak tidak jenuh dalam pakan menjadi asam lemak jenuh dalam daging. Hal ini telah dibuktikan oleh Soebagyo *et al.* (2000), bahwa semakin lama waktu penggemukan sapi akan menghasilkan daging dengan kadar asam lemak jenuh yang lebih tinggi dan asam lemak tidak jenuh yang lebih rendah ($P<0,05$). Berdasarkan kenyataan ini, maka Cook dalam Lawrie (1995) menyarankan agar pemberian pakan dengan asam lemak tidak jenuh bagi ruminansia dalam usaha untuk meningkatkan ketidakjenuhan asam lemak dagingnya, maka perlu diberi formaldehit

Tabel 1. Profil asam lemak daging domba lokal pada bobot potong yang berbeda
(Fatty acids profile of local lamb on different slaughter weight)

Asam lemak (Fatty acids) (mg/100g)	Rataan bobot potong (Average of slaughter weight)					
	7,07 kg	10,13 kg	15,13 kg	20,27 kg	25,20 kg	30,13 kg
Lauric acid (C12:0)	40,15 ^b	21,86 ^d	27,03 ^e	11,41 ^b	3,86 ^a	12,29 ^c
Myristic acid (C14:0)	111,17 ^e	82,42 ^d	132,48 ^f	47,50 ^b	34,57 ^a	58,34 ^c
Myristolic acid (C14:1)	37,93	26,17	32,17	27,36	17,53	20,75
Palmitic acid (C16:0)	497,78 ^c	638,44 ^e	851,94 ^f	442,86 ^b	367,10 ^a	619,55 ^d
Palmitoleic acid (C16:1)	52,09 ^b	45,59 ^a	255,38 ^f	249,63 ^e	220,95 ^d	137,09 ^c
Heptadecanoic acid (C17:0)	51,84	46,05	64,60	62,09	50,20	47,70
Stearic acid (C18:0)	367,39	323,73	442,55	326,48	286,29	310,41
Oleic acid (C18:1)	684,24	684,34	887,31	682,89	570,07	650,56
Linoleic acid (C18:2)	1247,17	1206,95	2042,48	1576,77	1337,53	1279,60
Linolenic acid (C18:3)	287,93	157,49	218,41	179,33	168,76	184,62

^{a, b, c, d, e, f} Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ($P<0,05$).
(Different superscript at the same raw indicating significant differences ($P<0,05$)).

terlebih dahulu agar asam lemak pakan tersebut tidak dihidrolisis oleh mikroflora rumen.

Rerata kadar asam lemak miristolat, heptadecanoat, stearat, oleat, linoleat, dan linolenat masing-masing adalah 27,07; 53,75; 342,81; 693,23; 1448,42; dan 199,42 mg/100 g daging. Seperti telah disebutkan di atas, asam lemak heptadecanoat dan stearat termasuk asam-asam lemak jenuh, sedangkan miristolat, oleat, linoleat, dan linolenat adalah asam-asam lemak tidak jenuh. Seperti halnya asam linoleat, asam linolenat juga esensial bagi tubuh manusia. Asam linolenat termasuk PUFA dan dikenal dengan nama asam lemak omega-3. Manfaat omega-3 bagi kesehatan tubuh yakni sebagai bahan penyusun lemak struktural yang membangun 60% bagian otak manusia (Khomsan, 2004). Asam lemak ini merupakan zat gizi penting bagi perkembangan bayi, terutama bagi perkembangan fungsi syaraf dan penglihatan. Peningkatan kekebalan tubuh, penghambatan beberapa jenis kanker juga sangat dipengaruhi oleh asam lemak omega-3. Risiko penyakit jantung koroner dapat diturunkan hingga 50% dengan mengkonsumsi zat ini, karena kemampuannya menekan LDL sehingga mengurangi risiko aterosklerosis, namun yang perlu diwaspadai adalah konsumsi asam lemak omega-3 (dan omega-6) secara berlebihan juga dapat menurunkan kolesterol HDL (Apriadiji, 2003; Khomsan, 2004).

Profil asam lemak daging domba lokal pada jenis otot yang berbeda

Profil asam lemak daging domba lokal pada jenis otot yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa kadar lemak daging domba dari bagian *loin*, paha, dan pundak menunjukkan perbedaan yang tidak nyata ($P>0,05$). Perbedaan yang tidak nyata dari kadar asam lemak daging pada ketiga lokasi otot ini kemungkinan karena domba dipelihara dengan cara dikandangkan terus menerus sehingga aktivitas gerak pada otot paha dan pundak terbatas yang berakibat lemak cenderung ditimbun pada bagian tersebut seperti halnya pada otot *loin* yang kurang digunakan untuk bergerak.

Secara kuantitatif dapat dilihat pada Tabel

2, bahwa kadar asam lemak daging domba pada bagian pundak cenderung paling tinggi, kemudian diikuti pada bagian paha dan paling rendah pada bagian *loin*. Hal ini dapat dipakai sebagai acuan bagi konsumen dalam memilih bagian daging untuk dikonsumsi. Bagi konsumen yang menginginkan daging dengan kadar asam lemak yang relatif lebih rendah dapat memilih daging dari bagian *loin*.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar asam lemak daging domba terdiri dari asam linoleat, oleat, palmitat, dan stearat. Daging domba dengan kadar asam lemak laurat, miristat, dan palmitat (asam-asam lemak jenuh) yang rendah dapat diperoleh dari BP 25 kg (umur 9 bulan), sedangkan daging domba dengan kadar asam lemak palmitoleat (asam lemak tidak jenuh) yang tinggi dapat diperoleh dari BP 15 kg (umur 5 bulan). Kadar asam lemak daging dari bagian *loin*, paha, dan pundak ada perbedaan yang tidak nyata, tetapi secara kuantitatif daging dari bagian *loin* cenderung mengandung asam lemak yang lebih rendah.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada (1) Rektor UGM dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, yang telah memberikan kesempatan dan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) kepada penulis untuk mengikuti program S-3 di Sekolah Pasca Sarjana UGM; (2) Rektor dan Dekan Fakultas Peternakan UNDIP, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti program S-3; (3) Prof. Dr. Ir. C. Imam Sutrisno yang telah memberikan sumbang saran dari perencanaan hingga pelaksanaan penelitian ini; (4) Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro beserta staf dan Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, yang telah memberikan kesempatan untuk memperoleh dana penelitian Hibah Bersaing yang sangat

Asam lemak (Fatty acid)	(mg/100g)
Lauric acid (C12:0)	
Myristic acid (C14:0)	
Myristolic acid (C14:1)	
Palmitic acid (C16:0)	
Palmitoleic acid (C16:1)	
Heptadecanoic acid (C17:0)	
Stearic acid (C18:0)	
Oleic acid (C18:1)	
Linoleic acid (C18:2)	
Linolenic acid (C18:3)	

membantu pelaksanaan penelitian ini.
Rudi Setiawan
membantu pelaksanaan penelitian ini.
Rekan-rekan di
Potong Fakultas Peternakan
memberikan dukungan dan bantuan
penelitian ini.

- Almatsier, S. 2001. *Analisa Statisik dan Pemuliaan UGM, Yogyakarta*. Pustaka Utama, Butterfield, R. M., 2003. *Growth, The Anatomy, and Physiology of the Animal*. Gomez, K. A. dan J. S. Baharsak, 2004. *Statistik untuk Kualitas Sumberdaya Manusia*. Diterjemahkan oleh Khomsan, A. 2004. *Statistik untuk Kualitas Sumberdaya Manusia*. Penerjemah: J. S. Baharsak.

daging domba pada
tinggi,
an paha dan paling
ini dapat dipakai
en dalam memilih
konsumsi. Bagi
kan daging dengan
lebih rendah dapat
in.

itian ini dapat
a besar asam lemak
am linoleat, oleat,
ng domba dengan
aristat, dan palmitat
yang rendah dapat
(umur 9 bulan),
dengan kadar asam
lemak tidak jenuh)
dari BP 15 kg (umur
daging dari bagian
erbedaan yang tidak
daging dari bagian
ng asam lemak yang

Kasih

disampaikan kepada
Direktorat Jenderal
Kementerian Pendidikan
berikan kesempatan
ascasarjana (BPPS)
kuti program S-3 di
M; (2) Rektor dan
UNDIP, yang telah
ilis untuk mengikuti
r. C. Imam Sutrisno
imbang saran dari
naan penelitian ini;
elitian Universitas
an Bagian Proyek
berdaya Manusia,
ndidikan Tinggi,
asional, yang telah
untuk memperoleh
saing yang sangat

Tabel 2. Profil asam lemak daging domba lokal pada otot yang berbeda
(*Fatty acid profile of local lamb on different muscle*)

Asam lemak (<i>Fatty acids</i>) (mg/100g)	Lokasi otot (<i>Location of muscle</i>)		
	Punggung (<i>Loin</i>)	Paha (<i>Leg</i>)	Bahu (<i>Shoulder</i>)
Lauric acid (C12:0)	17,57	15,80	24,94
Myristic acid (C14:0)	69,55	77,25	86,45
Myristolic acid (C14:1)	28,19	26,57	26,47
Palmitic acid (C16:0)	505,46	578,46	624,92
Palmitoleic acid (C16:1)	128,42	191,65	160,30
Heptadecanoic acid (C17:0)	46,19	58,42	56,63
Stearic acid (C18:0)	298,62	356,29	373,52
Oleic acid (C18:1)	613,03	732,82	733,86
Linoleic acid (C18:2)	1259,44	1513,61	1572,20
Linolenic acid (C18:3)	145,34	269,61	183,33

membantu pelaksanaan penelitian ini; (5) Aries Rudi Setiawan dan kawan-kawan yang membantu pelaksanaan penelitian; serta (6) Rekan-rekan di Laboratorium Ilmu Ternak Potong Fakultas Peternakan UNDIP yang telah memberikan dukungan sepenuhnya pada penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Almatsier, S. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Apriadiji, W. H. 2003. Sukses mengontrol kelebihan kolesterol. Nirmala. 05/V/Mei 2003: 18-21.
- Astuti, M. 1980. Rancangan Percobaan dan Analisa Statistik Bagian I. Bagian Pemuliaan Ternak Fakultas Peternakan UGM, Yogyakarta.
- Bahar, B. 2003. Panduan Praktis Memilih Produk Daging Sapi. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Butterfield, R. M., 1988. New Concepts of Sheep Growth. The Departement of Veterinary Anatomy. University of Sydney, Sydney.
- Gomez, K. A. dan A. A. Gomez. 1995. Prosedur Statistik untuk Penelitian Pertanian. Diterjemahkan oleh : E. Sjamsuddin dan J. S. Baharsjah. UI-Press, Jakarta.
- Khomsan, A. 2004. Peranan Pangan dan Gizi untuk Kualitas Hidup. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lawrie, R. A. 1995. Ilmu Daging. Diterjemahkan oleh: A. Parakkasi. UI-Press, Jakarta.
- Legowo, A. M. 1996. Masalah lemak dan kolesterol dalam bahan pangan hewani. Media. Edisi II Tahun XXI, Juni 1996: 8-15.
- Legowo, A. M. 2004. Kajian tentang pengembangan produk ternak rendah lemak dan tinggi asam lemak tidak jenuh. Jurnal Pengembangan Peternakan Tropis. 29 (4): 225-233.
- Lehninger, A. L. 1990. Dasar-dasar Biokimia Jilid 2. Cetakan Pertama. Diterjemahkan oleh: M. Thenawidjaja. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lestariana, W. 2003. Tinjauan Biokimiawi Pola Makan untuk Mencegah Penyakit Defisiensi dan Penyakit Degeneratif. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mandell, I. B., J. G. Buchanan-Smith, B. J. Holub, dan C. P. Campbell. 1997. Effect of fish meal in beef cattle diets on growth performance, carcass characteristics, and fatty acid composition of longissimus muscle. J. Anim. Sci. 75: 910-919.
- Meyes, P. A. 1999. Biosintesis Asam Lemak. Dalam: Biokimia Harper. R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes, dan V. W. Rodwel, Eds. Diterjemahkan oleh : A.

- Hartono. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta. PP. 222-229.

Park, P. W. dan R. E. Goins. 1994. In situ preparation of fatty acids methyl ester for analysis of fatty acids composition in foods. *J. Food Sci.* 59(6): 1262-1266.

Romans, J. R., W. J. Costello, C.W. Carlson, M.L. Greaser dan K.W. Jones. 1994. *The Meat We Eat*. Interstate Publishers, Inc. Danville, Illinois.

Rusman, Soeparno, Setiyono, dan A. Suzuki. 2000. Characteristics of biceps femoris and longissimus thoracis muscle of five cattle breeds grown in a feedlot system. *J. Anim. Sci.* 74: 59-65.

Soebagyo, Y., N. Ngadiono, dan Z. Bachrudin. 2000. Pengaruh lama penggemukan terhadap pertambahan bobot badan harian dan komposisi asam lemak daging sapi brahman cross. *Animal Production*. Vol 2 (1): 33-39.

Soeparno. 1989. *Kimia dan Nutrisi Daging*. Fakultas Peternakan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soeparno. 1994. *Ilmu dan Teknologi Daging*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Soeparno. 1995. *Teknologi Produksi Karkas dan Daging*. Fakultas Peternakan, Program Pascasarjana Ilmu Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Stell, R. G. D. dan J. H. Torrie. 1991. *Prinsip dan Prosedur Statistika*. Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh: B. Sumantri. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

FERMENTA EVALUA I

Penelitian berikut menunjukkan bahwa ketersediaan energi aerobik menggunakan teknologi dilanjutkan ini mengandung protein 12 minggu dipuasa dengan fermentasi (OF-0) pada pelolohan basah. Peningkatan jam dan ekskreta cairan. Variabel kecernaan terhadap *soluble protein* (TP) dengan ANOVA pola searah menunjukkan bahwa dari OF-0 sampai dengan 12 minggu amino meningkat berpola searah namun nutrien relatif tidak berpola searah. Peningkatan tajam. Nilai TDDM pada akhirnya nyata ($P<0,05$) pada akhirnya kemudian menurun.

(Kata kunci)

Jurusan Peternakar

²Fakultas Peternaka