

ISSN : 1907-1760

Volume 14 Nomor 1 Edisi Februari 2012

Jurnal Pernakan Indonesia

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

INDONESIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



JURNAL PETERNAKAN INDONESIA INDONESIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

ISSN 1907-1760

Ketua Redaksi	: Ellyza Nurdin
Wakil	: Andri
Anggota	: Wizna Nuraini Rusmana W.S. Ningrat Maria Endo Mahata Rahmi Wati
Sekretariat	: Edwin Heryanto Aronal Arif Putra Eli Ratni Lendrawati

ALAMAT REDAKSI

Redaksi Jurnal Peternakan Indonesia
Fakultas Peternakan Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang, 25163 - Sumatera Barat
Telp./Fax: +62-751-71464

Mobile: +62-81266031180 (Rahmi Wati, S.Pt, M.Si)
+62-81266161699 (Eli Ratni, S.Pt, MP)

e-mail: jpi.andalas@yahoo.com; <http://jpi-unand.blogspot.com/>

Jurnal Peternakan Indonesia (JPI) ISSN 1907-1760 diterbitkan oleh Fakultas Peternakan Universitas Andalas, sebagai media publikasi hasil penelitian, pengkajian dan pendalaman literatur tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang peternakan dan kehewan. JPI diterbitkan untuk menyempurnakan dan melanjutkan Jurnal Peternakan dan Lingkungan (JPL) yang telah ada semenjak bulan Oktober 1994. JPI diterbitkan tiga kali dalam setahun pada bulan Februari, Juni dan Oktober. Tulisan/karya ilmiah yang diterima belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dipertimbangkan untuk dipublikasikan di jurnal lain. Biaya berlangganan/tahun Rp. 135.000,- (belum termasuk ongkos kirim)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University



EDITORIAL

Anierra everyernie
25/9-2013

Jurnal Peternakan Indonesia (*Indonesian Journal of Animal Science*) disingkat dengan JPI, merupakan kelanjutan dari Jurnal Peternakan dan Lingkungan yang telah terbit semenjak tahun 1994 dan berakhir masa akreditasinya pada tahun 2005. JPI diterbitkan oleh Fakultas Peternakan Universitas Andalas tiga kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Februari, Juni dan Oktober.

Perubahan dilakukan tidak hanya dari nama dan tampilan fisik, tetapi juga diikuti dengan penyempurnaan aspek mutu sebagai media ilmiah. Naskah yang dimuat dalam JPI merupakan hasil penelitian, hasil telaah dan laporan ilmiah yang terkait dengan aspek ilmu, teknologi, ekonomi dan sosial bidang peternakan dan kehewan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha peternakan dan kehewan.

Penyempurnaan juga dilakukan oleh penyunting ahli dan tim redaksi. Tim penelaah terdiri dari personel yang telah diakui kepakarannya pada beragam disiplin ilmu di bidang peternakan dan kehewan dari Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Jambi, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Udayana, dan Balai Penelitian Ternak (Balitnak). JPI diharapkan menjadi media pilihan bagi para peneliti untuk mempublikasikan karya ilmiah yang bermutu.

Padang, Februari 2012

Editor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi **Jurnal Peternakan Indonesia** memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pakar yang telah diundang selaku mitra bestari, yang telah menelaah semua naskah baik yang layak terbit maupun yang tidak layak terbit dalam Volume 14 (1) Edisi Februari 2012. Berikut adalah daftar nama pakar yang diundang oleh redaksi :



Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Fakultas Peternakan, Universitas Andalas
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas
Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
Fakultas Pertanian, Universitas Riau
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Udayana
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas
Balai Penelitian Ternak, Ciawi - Bogor
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas
Fakultas Peternakan, Universitas Jambi
Fakultas Peternakan, Universitas Andalas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR ISI
Volume 14. No 1. Februari 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hancinta miki IPS (Institut Pertanian Bogor) Bogor Agricultural University

	Halaman
Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Pesisir Selatan. A. Suresti dan R. Wati	249 – 262
Studi Suhu Pengovenan terhadap Umur Simpan Telur Asin. D. Novia, M. Melia dan N.Z. Ayuza	263 – 269
Pengaruh Penambahan Bahan Organik dalam Pembuatan Pupuk Organik Padat <i>Sludge</i> Biogas Feses Sapi Perah terhadap Kandungan N, P, dan K. S. Vebriyanti, E. Purwati, dan Apriman	270 – 278
Pengaruh Dosis Pupuk N, P, dan K terhadap Kecernaan Secara <i>In Vitro</i> Rumput Pajah (<i>Pennisetum purpureum</i>) cv. Taiwan yang di Inokulasi CMA <i>Glomus manihotis</i> pada Lahan Bekas Tambang Batubara. Ifradi, Evitayani, A. Fariani, L. Warly, Suyitman, S. Yani, dan Emikasmira	279 – 285
Analisis Efisiensi Teknis Usaha Penggemukan Sapi Potong di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. I. Indrayani, R. Nurmalina, dan A. Fariyanti	286 – 296
Kualitas Fermentasi Silase Ransum Komplek Berbasis Hasil Samping Jagung, Sawit dan Ubi Kayu. Lendrawati, Nahrowi, dan M. Ridla	297 – 303
Identifikasi Marka Bioakustik Suara Kokok Ayam <i>Kokok Balenggek</i> di Kandang Penangkaran “Agutalok”, Kabupaten Solok. Rusfidra, Y.Y. Tumatra, M.H. Abbas, Y. Heryandi, dan F. Arlina	303 – 307
Cemaran Timbal (Pb) dan Arsen (As) pada Susu Sapi Perah yang Diberi Pakan Limbah Organik Pasar di Peternakan Sapi Perah Kebon Pedes Bogor. Salundik, Suryahadi, S.S. Mansjoer, D. Sopandie, dan W. Ridwan	308 – 318
Status Keberlanjutan Wilayah Berbasis Peternakan Sapi Potong Terpadu di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Suyitman, S.H. Sutjano dan A. Djulardi	318 – 336
Morfometri <i>Kokon Attacus atlas</i> Hasil Pemeliharaan di Laboratorium. Y.C. Endrawati dan A.M. Fuah	337 – 342

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Kualitas Fermentasi Silase Ransum Komplit Berbasis Hasil Samping Jagung, Sawit dan Ubi Kayu

Fermentation Quality of Complete Feed Silage Based on Corn, Palm and Cassava by Products

Lendrawati, Nahrowi, dan M. Ridla

Fakultas Peternakan Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manis Padang, 25163

e-mail: len1303@yahoo.com

(Diterima: 12 Mei 2011; Disetujui: 1 Oktober 2011)

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate fermentation quality of complete feed silage based on corn, palm and cassava by products. Each complete feed was ensiled separately in 50 litres silo and were opened 6 weeks after ensiling. The silage products were evaluated in terms of physical (colour, smell, and presence of moulds), chemical (pH, N-amonia content, WSC loss and dry matter loss) and microbial properties (number of lactic acid bacteria). The data was analyzed by using Completely Randomized Design with three treatments and six replications, followed by LSD test. The result showed that all complete feed silage treatments were having good quality. Fermentation quality of silage was affected with kind of complete feed silage ($P < 0.05$). In general, all of treatments had good fermentation quality of silage, because it have lower pH, ammonia content, WSC loss and dry matter also. It is concluded that quality fermentation of complete feed silage based on corn, palm and cassava by products had good quality and can be recommended as ruminant feeding.

Keywords: completed feed silage, quality fermentation

PENDAHULUAN

Ketersediaan pakan masih menjadi kendala pengembangan ternak ruminansia di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar bahan pakan bersifat musiman, terkonsentrasi di suatu wilayah dan tidak tepatnya manajemen pengelolaan pakan yang diterapkan selama ini. Faktor lainnya adalah semakin sempitnya lahan penanaman hijauan pakan karena dialih fungsikan menjadi kawasan pemukiman dan industri. Akibatnya kualitas dan harga pakan menjadi fluktuatif, selanjutnya mempengaruhi produktivitas ternak. Sehingga diperlukan suatu teknologi peyiapan pakan yang tidak hanya tahan simpan, tapi juga mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ternak. Salah satunya adalah teknik silase ransum komplit dengan memanfaatkan sumber pakan lokal.

Berbeda dengan silase berbahan baku tunggal seperti silase rumput atau jerami jagung, silase ransum komplit mempunyai beberapa keuntungan diantaranya: 1)

tersedianya substrat yang mendukung terjadinya fermentasi yang baik, sehingga mempunyai tingkat kegagalan yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan silase berbahan tunggal. 2) mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ternak. Hasil samping tanaman jagung dan ubi kayu serta pengolahan sawit merupakan sumber bahan baku pakan lokal yang cukup tersedia sepanjang tahun. Sistem pengolahan bahan baku di atas selama ini melalui teknik pengeringan yang sangat tergantung dengan musim, sehingga kurang tepat untuk dikembangkan.

Kajian terdahulu mengenai pemberian 100% silase ransum komplit berbasis sampah organik tidak menunjukkan adanya gangguan pencernaan dan fungsi metabolisme pada sapi perah (Ramli *et al.*, 2006). Sementara pemanfaatan hasil samping jagung, sawit dan ubi kayu dalam bentuk silase ransum komplit selama ini belum pernah dilaporkan. Berdasarkan pemikiran



di atas, maka dilakukan penelitian untuk mengkaji kualitas fermentasi dan nutrisi silase ransum komplit berbasis hasil samping jagung, sawit dan ubi kayu.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni 2008 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak Perah Fakultas Peternakan IPB. Bahan utama penelitian ini adalah hasil samping sawit (daun, lumpur, serabut buah dan bungkil inti sawit), jagung (jerami, kulit, tongkol dan jagung giling) dan ubi kayu (daun, kulit dan onggok). Bahan tambahan lain terdiri dari rumput gajah, bungkil kelapa, dedak padi, molases, urea dan premiks. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah *chopper*, timbangan, silo, kandang metabolik dan peralatan laboratorium lainnya. Ransum perlakuan disusun berdasarkan kebutuhan ternak domba masa pertumbuhan yaitu dengan kandungan protein kasar 12,81% dan TDN 67% (NRC 1985).

Silase ransum komplit berbasis hasil samping jagung (SRKJ), silase ransum komplit berbasis sawit (SRKS), dan silase ransum komplit berbasis ubi kayu (SRKU) dibuat sesuai formulasi dan terdiri atas enam ulangan pada setiap perlakuan. Sumber hijauan (rumput gajah, jerami jagung, kulit jagung, tongkol jagung, daun

kelapa sawit, daun dan kulit ubi kayu) pada masing-masing perlakuan terlebih dahulu dipotong 3–5 cm dengan menggunakan *chopper*. Kemudian dilayukan selama 12 jam (satu malam) pada ruang terbuka. Masing-masing hijauan tersebut selanjutnya dicampur dan diaduk sampai merata dengan sumber konsentrat (dedak padi, bungkil kelapa, jagung, onggok, bungkil inti sawit, molases, urea dan premiks) sesuai dengan perlakuannya. Komposisi kimia ransum komplit masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 1. Hasil campuran ransum tersebut dimasukkan ke dalam silo (tong plastik volume 50 liter), dipadatkan, ditutup rapat dan diinkubasi dalam kondisi anaerob selama enam minggu. Sampel silase dari masing-masing perlakuan diambil untuk analisa kualitas fermentasi dan nutrisi di laboratorium.

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah kualitas fermentasi ditentukan berupa karakteristik fisik, kimia dan mikrobial. Karakteristik fisik (melalui pengamatan) meliputi warna, bau dan keberadaan jamur dengan cara memisahkan dan menimbang produk silase yang terkontaminasi jamur pada permukaan silo. Karakteristik kimia; pengukuran pH menggunakan pH meter, bahan kering melalui analisa proksimat (AOAC 1999), N-NH₃ metode difusi Conway (1957), total gula dari Water Soluble Carbohydrate (WSC) berdasarkan Dubois *et al.* (1956).

Tabel 1. Komposisi kimia ransum komplit masing-masing perlakuan

Komposisi kimia ransum komplit (%BK)	Basis Jagung (SRKJ)	Basis Sawit (SRKS)	Basis Ubi Kayu (SRKU)
Protein kasar	12,81	12,81	12,82
Lemak kasar	6,38	10,53	6,96
Serat kasar	19,68	26,10	17,78
Abu	7,79	10,88	9,89
BETN	55,74	42,72	59,90
TDN	67,00	67,00	67,24
Kalsium	0,293	0,302	0,327
Pospor	0,549	0,602	0,553



Karakteristik kimia; pengukuran pH menggunakan pH meter, bahan kering melalui analisa proksimat (AOAC 1999), N-NH₃ metode difusi Conway (1957), total gula dari Water Soluble Carbohydrate (WSC) berdasarkan Dubois *et al.* (1956). Sementara karakteristik mikrobial silase dilakukan dengan cara penghitungan jumlah koloni bakteri asam laktat pada media MRS agar berdasarkan metode *Total Plate Count* (TPC) menurut Fardiaz (1992). Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 3 perlakuan (SRKJ, SRKS dan SRKU) dengan 6 kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisis ragam dengan software SPSS versi 15.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Fisik Silase Ransum Komplit

Hasil pengamatan silase ransum komplit berbasis hasil samping jagung, sawit dan ubi kayu setelah 6 minggu ensilase menunjukkan warna yang tidak jauh berbeda dari sebelum ensilase yaitu campuran hijau, kuning dan coklat (Tabel 2). Campuran ketiga warna ini merupakan pengaruh keanekaragaman bahan yang digunakan pada pembuatan silase seperti; rumput gajah, daun ubi kayu, daun kelapa sawit, jerami jagung, serat buah sawit, kulit ubi kayu, dedak padi, bungkil kelapa dan lumpur sawit. Hal ini sesuai dengan yang direkomendasikan Macaulay (2004) bahwa silase yang berkualitas baik ditunjukkan dengan warna hijau terang sampai kuning atau hijau kecoklatan tergantung materi silase.

Semua perlakuan silase ransum komplit setelah 6 minggu ensilase menunjukkan bau khas fermentasi asam laktat. Hal ini didukung oleh pernyataan Saun dan Heinrichs (2008) bahwa silase yang baik akan mempunyai bau seperti susu fermentasi karena mengandung asam laktat, bukan bau yang menyengat.

Keberadaan jamur pada permukaan silo ditemukan pada perlakuan SRKJ dan SRKS sebesar 7,64 dan 3,83%. Sementara perlakuan SRKU tidak terkontaminasi jamur. Persentase jamur yang didapatkan pada penelitian ini lebih rendah dari pernyataan Davies (2007) bahwa keberadaan jamur pada produk silase sekitar 10%.

Karakteristik Kimia dan Mikrobial Silase Ransum Komplit

pH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH ransum komplit berbasis hasil samping jagung, sawit dan ubi kayu setelah 6 minggu ensilase adalah 3,80, 3,90 dan 3,85. Nilai ini menunjukkan bahwa silase ransum komplit mempunyai kualitas fermentasi yang baik sekali (ditandai dengan pH<4). Hal ini sesuai dengan pendapat McCullough (1978) dan Macaulay (2004) yang menyatakan bahwa silase dengan pH 3,2–4,2 tergolong pada silase yang berkualitas baik sekali. Nilai pH tersebut juga mengindikasikan bahwa silase ransum komplit sudah layak disimpan.

Analisis ragam menunjukkan pH silase nyata ($P<0,05$) dipengaruhi oleh perlakuan jenis silase ransum komplit. Nilai pH terendah terlihat pada perlakuan SRKJ yaitu 3,80, dan nilai pH tertinggi pada perlakuan SRKS yaitu 3,90 (Tabel 3). Perbedaan pH antar perlakuan ini disebabkan berbedanya bahan, komposisi kimia dan mikrobial pada masing-masing perlakuan. Hal ini sejalan dengan laporan Kizilsimsek *et al.* (2005) bahwa bahan baku dan tipe silo mempengaruhi kualitas silase secara fisik dan kimia. Sementara Kung dan Shaver (2001) menyatakan bahwa pH silase berhubungan dengan produksi asam laktat pada proses ensilase, pH yang rendah mencerminkan produksi asam laktat yang tinggi. Perlakuan SRKJ mempunyai pH yang lebih rendah dibanding SRKS dan SRKU. Hal ini juga didukung oleh jumlah koloni bakteri asam laktat yang lebih banyak dari pada perlakuan yang lainnya, sehingga memproduksi asam lebih tinggi.



Jumlah Koloni Bakteri Asam Laktat

Data jumlah koloni bakteri asam laktat sebelum ensilase pada perlakuan SRKJ, SRKS dan SRKU berturut-turut adalah $6,7 \times 10^7$, $2,7 \times 10^6$ dan $4,0 \times 10^6$ cfu/g. Hal ini menunjukkan bahwa populasi bakteri asam laktat yang terdapat pada semua perlakuan melebihi batasan minimal ($>10^5$ cfu/g) untuk mendukung terjadinya proses fermentasi yang baik (McDonald *et al.*, 1991; Beckmaster 1992). Sehingga tidak diperlukan tambahan inokulan bakteri asam laktat dari luar.

Jumlah koloni bakteri asam laktat pada masing-masing perlakuan berbeda ($P < 0,05$) setelah 6 minggu ensilase. Perlakuan SRKJ memperlihatkan jumlah koloni bakteri asam laktat tertinggi ($9,2 \times 10^5$ cfu/g), diikuti perlakuan SRKS dan SRKU ($8,5 \times 10^4$ dan

$8,0 \times 10^4$ cfu/g). Proses fermentasi menyebabkan penurunan jumlah koloni bakteri asam laktat. Hal ini berhubungan dengan sifat bakteri asam laktat dan pH yang dihasilkan pada ensilase. Menurut Mc Donald *et al.* (1991) bakteri asam laktat dapat bertahan hidup mulai dari pH 4,0 sampai 6,8. Bahkan *Pediococcus damnasus (cerevisae)* dapat bertahan pada pH 3,5. Sementara *Streptococcus* umumnya bertahan pada pH sekitar 4,5 sampai 5,0. Sedangkan spesies *Lactobacillus* akan tumbuh subur pada pH 4,5 sampai 6,4. Tingginya populasi pada perlakuan SRKJ diperkirakan karena bakteri asam laktat pada SRKJ berbeda, dan lebih tahan terhadap pH rendah dibandingkan bakteri asam laktat pada perlakuan SRKS dan SRKU. Sementara itu perlakuan SRKS dan SRKU diduga mempunyai jenis bakteri asam laktat yang sama.

Tabel 2. Karakteristik fisik silase ransum komplit berbasis hasil samping jagung, sawit dan ubi kayu setelah 6 minggu *ensilase*.

Peubah	Perlakuan		
	SRKJ	SRKS	SRKU
Warna	campuran hijau, kuning dan coklat	campuran hijau, kuning dan coklat	campuran hijau, kuning dan coklat
Bau	khas fermentasi asam laktat	khas fermentasi asam laktat	khas fermentasi asam laktat
Keberadaan jamur (%)	7,64	3,83	tidak ada

Keterangan: SRJK (silase ransum komplit berbasis hasil samping jagung), SRKS (silase ransum komplit berbasis hasil samping sawit), SRKU (silase ransum komplit berbasis hasil samping ubi kayu)

Tabel 3. Karakteristik kimia ransum komplit berbasis hasil samping jagung, sawit dan ubi kayu setelah 6 minggu *ensilase*.

Peubah	Perlakuan		
	SRKJ	SRKS	SRKU
pH silase	$3,80^c \pm 0,01$	$3,90^a \pm 0,05$	$3,85^b \pm 0,01$
Jumlah koloni bakteri asam laktat (cfu/g)	$9,2 \times 10^5 \pm 0,46$	$8,5 \times 10^4 \pm 0,07$	$8,0 \times 10^4 \pm 0,13$
Kehilangan WSC (%BK)	$4,17^b \pm 0,24$	$2,92^c \pm 0,19$	$5,68^a \pm 0,46$
Kadar N-amonia (%TN)	$7,99 \pm 0,95$	$7,18 \pm 0,42$	$7,68 \pm 0,98$
Kehilangan bahan kering (%)	$7,20^a \pm 0,45$	$4,60^{bc} \pm 1,07$	$4,00^c \pm 0,61$

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata ($P < 0,05$) SRJK (silase ransum komplit berbasis hasil samping jagung), SRKS (silase ransum komplit berbasis hasil samping sawit), SRKU (silase ransum komplit berbasis hasil samping ubi kayu)



Kehilangan WSC (*Water Soluble Carbohydrate*)

Kandungan WSC pada perlakuan SRKJ, SRKS dan SRKU sebelum ensilase adalah 8,71% BK, 6,17% BK dan 13,14% BK. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap perlakuan mempunyai kandungan WSC melebihi kebutuhan minimal (3–5% BK) untuk mendapatkan fermentasi yang baik (McDonald *et al.*, 1991). Data penelitian menunjukkan adanya variasi pemanfaatan WSC selama proses fermentasi pada semua perlakuan ($P < 0,05$). Perlakuan SRKU memperlihatkan kehilangan WSC tertinggi yaitu 5,68% BK diikuti perlakuan SRKJ (4,17% BK) dan SRKS (2,92% BK) seperti terlihat pada Tabel 3. Jones *et al.* (2004) menyatakan bahwa proses fermentasi merupakan aktivitas biologis bakteri asam laktat mengkonversi gula-gula sederhana menjadi asam (terutama asam laktat). Komponen gula dimanfaatkan mulai dari fase awal ensilase sampai tercapainya fase stabil yang ditandai dengan dominannya bakteri asam laktat dan tidak terjadi lagi penurunan pH. Tingginya penurunan kandungan WSC pada SRKU diduga karena mengandung komponen monosakarida lebih tinggi dibandingkan dengan kedua perlakuan lainnya. Di samping itu penurunan pH pada perlakuan SRKU juga lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan SRKJ dan SRKS (2,05 vs 1,66 dan 1,22). Sehingga bakteri asam laktat membutuhkan gula lebih banyak untuk memproduksi asam laktat.

Kandungan N-amonia

Kadar amonia ransum komplit berbasis hasil samping jagung, sawit dan ubi kayu sebelum ensilase berturut-turut 3,88% TN, 1,99% TN dan 0,48% TN. Hal ini disebabkan terjadinya reaksi proteolisis oleh enzim tanaman pada saat pelayuan sebelum ensilase. McDonald *et al.* (1991) menyatakan bahwa proteolisis berlangsung sesaat setelah hijauan dipanen, dipotong dan terus berlangsung sampai beberapa jam setelah dimasukkan ke dalam silo. Reaksi ini

berhenti jika kondisi anaerob dalam silo telah tercapai.

Hasil penelitian menunjukkan kadar N-amonia setelah 6 minggu ensilase tidak dipengaruhi oleh jenis ransum komplit ($P > 0,05$). Perlakuan SRKJ memperlihatkan kadar N-amonia tertinggi (7,99% TN) diikuti oleh perlakuan SRKU (7,68% TN) dan SRKS (7,18% TN). Namun kadar N-amonia yang didapatkan pada penelitian ini masih dalam batasan yang normal pada silase yaitu kurang 10% (Saun dan Heinrichs 2008; Macaulay 2004; Kung dan Shaver 2001). Lebih tingginya kadar amonia perlakuan SRKJ dari pada perlakuan SRKS dan SRKU didukung oleh data penurunan kadar protein yang lebih tinggi pula (9,98% vs 4,43% dan 5,21%).

Kehilangan Bahan Kering

Data kehilangan bahan kering menunjukkan hasil yang berbeda ($P < 0,05$) pada masing-masing perlakuan silase ransum komplit. Namun perlakuan SRKS dan SRKU mengalami kehilangan bahan kering yang sama. Penurunan kandungan bahan kering tertinggi terlihat pada perlakuan SRKJ (7,20%), diikuti oleh perlakuan SRKS (4,60%) dan SRKU (4,00%).

Penurunan bahan kering yang didapat pada penelitian ini masih dalam batasan normal untuk suatu produk fermentasi. McDonald *et al.* (1991) menyatakan bahwa persentase kehilangan bahan kering pada silase yang dikelola dengan baik berkisar antara 7–20%. Lebih lanjut dijelaskan Davies (2007) bahwa kehilangan bahan kering tersebut terjadi saat pengisian (5%), menjadi cairan silase (3%), selama proses fermentasi (5%), kerusakan karena udara (10%) dan kehilangan di lapangan (4%). Kehilangan ini menandakan bahwa bakteri asam laktat memanfaatkan sejumlah nutrien untuk memproduksi asam. Karbohidrat yang mudah difermentasi yaitu komponen-komponen gula non struktural seperti; glukosa, fruktosa, galaktosa, mannososa, silosa



dan arabinosa merupakan komponen yang banyak dimanfaatkan oleh mikroorganisme selama fase fermentasi (McDonald *et al.*, 1991).

KESIMPULAN

Silase ransum komplit berbasis jagung, sawit dan ubi kayu mempunyai kualitas fermentasi yang baik. Hal ini ditandai dengan pH yang rendah (3,8–3,9), kehilangan bahan kering kurang 8% dan kadar amonia kurang 10%.

DAFTAR PUSTAKA

[AOAC] Association of Official Analytical Chemist. 1999. *Official Methods of Analysis*. Ed ke-16. Washington: AOAC International.

Buckmaster, D. 1992. Bacterial inoculants for silage. http://www.ege.psu.edu/extension/factsheets/i/I_111.pdf [Agustus 2008].

Conway, E.J. 1957. *Microdiffusion of Analysis of Assosiation Official Analytical Chemist*: Goergia Press.

Davies, D. 2007. Improving silage quality and reducing CO₂ emission. <http://www.Improving silage quality and reducing Cosub2-sub emission.htm> [Agustus 2008].

Dubois, M., Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A., and Smith, F. 1956. Colorimetric method for determination of sugars and related substances. *J Analytical Chemistry* 28(3): 350–356.

Fardiaz, S. 1992. *Mikrobiologi Pangan I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jones, C.M., Heinrichs, A.J., Roth, G.W., and Issler, V.A. 2004. *From Harvest to Feed: Understanding Silage*

Management. Pennsylvania: Pennsylvania State University.

Kizilsimsek, M., Erol, A., and Calislar, S. 2005. Effect of raw material and silo size on silage quality. *J Livestock Rasearch for Rural Development* 17(3):256–263.

Kung, L. and Shaver, R. 2001. Interpretation and use of silage fermentation analysis reports. *J Focus on Forage* 13(3).

Macaulay, A. 2004. Evaluating silage quality. <http://www1.agric.gov.ab.ca/departement/deptdocs.nsf/all/for4909.html> [Feb 2008].

McCullough, M.E. 1978. *Ruminant Nutrient*. Rome: Food and Agricultural Organization of Limited Nation.

McDonald, P., Henderson, A.R., and Heron, S.J.E. 1991. *The Biochemistry of Silage*. Second Edition. Marlow: Chalcombe Publication.

[NRC] National Research Council. 1985. *Nutrient Requirement of Sheep*. Washington DC: National Academy Press.

Ramli, N., Ridla, M., Toharmat, T., dan Abdullah, L. 2006. Pengaruh pakan asal limbah organik terhadap produksi, kualitas dan keamanan susu serta produksi biogas sapi perah. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Saun, R.J.V. and Heinrichs, A.J. 2008. *Troubleshooting silage problems: How to identify potential problem. Proceddings of the Mid-Atlantic Conference*; Pennsylvania, 26–26 May 2008. Penn State's Co llage. hlm 2–10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.